Sedação endovenosa

Cuidados depois da sedação

Profissional responsável: **Equipe Sorridere e serviço médico de anestesiologia**

Nas próximas 24 horas, não dirija, não opere máquinas e não tome decisões importantes. Fique com um acompanhante.

O que fazer

- ✓ Fique com um adulto responsável até o dia seguinte.
- ✓ Descanse em casa, sem atividades que exijam atenção.
- ✓ Levante-se devagar para evitar tontura.
- ✓ Comece com água e alimentos leves.
- ✓ Tome apenas os medicamentos receitados.

O que evitar

- ✗ Dirigir, andar de bicicleta ou operar máquinas por 24 horas.
- ✗ Bebida alcoólica por 24 horas.
- ✗ Assinar documentos ou decidir algo importante.
- ✗ Banho de banheira ou piscina sem alguém por perto.
- ✗ Tomar outros calmantes sem orientação.

Dicas para o dia a dia

- Antes da sedação, avise sempre medicamentos e alergias.
- Siga o jejum combinado e combine o acompanhante com antecedência.
- Unhas sem esmalte facilitam a leitura do oxigênio.

Depois da sedação

- Comece por caldos, frutas e alimentos leves e aumente aos poucos.
- Sentiu náusea? Espere um pouco e volte devagar.
- O local da veia pode ficar roxo ou dolorido por alguns dias.

É normal

- Sonolência e lentidão por algumas horas.
- Tontura leve ao levantar.
- Não lembrar do procedimento.
- Pequena mancha roxa no local da veia.

Ligue para nós se

- Dificuldade para respirar, lábios arroxeados ou desmaio.
- Vômitos repetidos.
- Dor, inchaço ou vermelhidão forte no local da veia.
- Sonolência excessiva ou confusão que não passa.

Retorno. A sedação é feita na clínica, com serviço médico de anestesiologia contratado. Casos de anestesia geral são encaminhados a hospital. Leia também a folha do procedimento realizado. Em emergência fora do horário da clínica (sangramento intenso, falta de ar, inchaço que dificulta respirar ou engolir), procure um pronto atendimento ou ligue 192.

Dúvidas? Fale no WhatsApp

Saiba mais sobre o tratamento

Como chegar à clínica